

腸見淨®粉劑

新的概念 一個舒服而有效的系統

讓您消除對大腸內視鏡與術前清腸的恐懼與疑慮


使用步驟

以低脂低殘渣餐飲，於檢查前二天代替一般飲食。

■上午檢查:前一天晚上6:00喝第一包，檢查當天早上4:30喝第二包。
(最晚請在早上 6:00 前喝完畢)

腸見淨®粉劑使用方式

- 第一包喝法:
第一包腸見淨粉劑喝完之後，請持續補充水分至排出澄清糞液為止，但建議補充水分總量至少 2000cc(不超過 3000cc)
- 第二包喝法:
第二包腸見淨粉劑：檢查當日早上 4：30 始，每 10~15 分鐘喝 250c.c，共計 1000c.c，最晚早上 6 點以前喝完畢，之後禁止再吃任何食物和水。



每包須以1000c.c.冷開水泡製成溶液，攪拌至粉末完全溶解。



每10-15分鐘喝250c.c，1000c.c溶液喝完之後持續補充水分至排出糞液澄清為止 (請於一小時內喝完)



約60-90分鐘後會開始腹瀉，清腸時間約3~4小時。

注意事項

1. 胃腸道阻塞、穿孔、腸塞、胃滯留、急性胃潰瘍等受檢者請勿使用腸見淨®粉劑。
2. 檢查前二天請勿食用高纖維食物(青菜、水果、肉類、奶製品)。
3. 檢查前日晚餐後與檢查當天早上請勿再進食，若察覺血糖太低，則以無顏色、無殘渣之糖果或運動飲料補充熱量。
4. 請檢查者按照使用步驟執行，並且確實喝完每包腸見淨®粉劑泡於 1000cc 之溶液，以提高腸道清淨度，縮短檢查時間。
5. 第一包腸見淨粉劑喝完之後，請持續補充水分至排出澄清糞液為止，但建議補充水分總量至少 2000cc(不超過 3000cc)
6. 第二包腸見淨粉劑：檢查當日早上 4：30 始，每 10~15 分鐘喝 250c.c，共計 1000c.c，最晚早上 6 點以前喝完畢，之後禁止再吃任何食物和水。
7. 其他口服藥品須於服藥前 1 小時使用，若有任何疑問，請與醫師討論。

有任何使用上問題，請撥打免費服務專線：0800-399989