

立達診所

Molax Oral Saline Laxative

皇佳[暢服]內服液劑 口服鹽類緩瀉劑

**洗腎病患
不建議使用**

大腸鏡準備事項：

- 一、檢查前二天請用低纖維飲食（如附表）。檢查前一天晚餐請進食清流質飲食，如湯粥、無渣果汁。
- 二、檢查後有「肚漲、腹痛、排氣（放屁或打嗝）」是因檢查時醫師需「灌氣」，建議多走動有助消肚漲與排氣。
約 6 小時 - 2 天症狀會減緩與改善。若**持續嚴重腹痛**請立即回診！

瀉藥服用方式（藥水45ml）：

檢查者注意事項

藥水 2 瓶分兩次喝

- ◆ 第一次於前一天晚上 6 點喝一瓶藥水加 240 c.c.~ 360 c.c. 水或較甜的無渣飲料（如：運動飲料、冬瓜茶、蜜茶、可樂、沙士），其後再於 3 小時內喝約 2000 c.c. 開水，直到大便解得稀且透明液體；12 點過後不要再喝水或含糖飲料，瀉劑除外。
- ◆ 第二次於檢查當天早上 4 點 30 分再喝一瓶藥水加 240 c.c.~ 360 c.c. 開水，請於上午 6 點前喝完，之後禁止再吃任何食物和水。

注意：

- 一、服用清腸藥液後盡量多走動或按摩腹部，以加速腸道蠕動及排便。
- 二、水分補充以預防脫水並有利徹底排便，**請喝足上述建議之水量**，直到拉出來的糞水澄清無渣為止。（請參閱背面圖）
- 三、**慢性病患者**，請在服用清腸劑之前 2 小時或之後 6 小時服用慢性病藥。服用高血壓藥者請多補充水分，**抗凝血藥如阿斯匹林需於一週前開始停用**。
- 四、如有吞嚥問題或容易反吐或吸入（aspiration），必須事先告知醫療人員。
- 五、服用第一瓶藥液後，若有嚴重脹氣或腹痛，必須等症狀緩解後才可服用第二瓶，只要持續排便，不適症狀即可緩解。
- 六、**洗腎、先天性巨結腸症、腸阻塞、鬱血性心衰竭腹水之病患不可使用**。
- 七、由於該藥液中含磷，若您同時接受抽血檢查時，血中磷值會暫時性偏高，此乃屬正常現象，一般於服用後 24-26 小時磷值會回復正常。
- 八、除醫師處方外，不可自行使用其他緩瀉劑。
- 九、若有任何脫水或嚴重不適，請與醫護人員聯絡。



一成藥品股份有限公司 總代理

新北市汐止區新台五路一段77號19樓之8
<http://www.success-medical.com.tw>